REVISTA PROYECCIONES: 11-23.
JORNADAS MATEMATICAS, AGOSTO 1983.

GEOMETRÍA DE CURVAS

Dra. RUBI RODRIGUEZ MORENO*

Al estudiar funciones multivaluadas, como por ejemplo $x \rightarrow y$ tal que $y^2 = x$, se puede cambiar el rango de la función para hacerla univaluada e.g. si $x, y \in \mathbb{R}$, restringamos y , a valores no negativos, o para hacerla diferenciable : e.g., restringamos y , a valores positivos.

Un camino diferente fue el seguido por Riemann, quien planteó la posibilidad de cambiar el dominio de la función multivaluada para así hacerla univaluada y diferenciable a la vez; si consideramos ahora $x, y \in \hat{\mathbb{C}}$ tales que $y^2 = x$, entonces y no es función unívoca de x ; en efecto, usando coordenadas polares $x = re^{i\theta}$, obtenemos $y(x) = \sqrt{r} e^{i\theta}$; partiendo de $x_0 = r_0 e^{i\theta_0}$ diferente de cero e ∞ y continuando $y(x)$ a lo largo de una curva cerrada que dé una vuelta al origen, de tal manera que θ aumenta en 2π , $y(x)$ llega con el valor

$$\sqrt{r_0} e^{\frac{1}{2} i(\theta_0 + 2\pi)} = -\sqrt{r_0} e^{i\theta_0} = -y_0 ;$$

* Profesora Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación.
Facultad de Ciencia. Universidad de Santiago de Chile.

repitiendo este proceso una vez más, volvemos a y_0 , el valor original.

Entonces, si cortamos $\hat{\mathbb{C}}$ a lo largo del eje Real positivo y no permitimos que $y(x)$ cruce este corte, obtenemos dos ramas univaluadas de $y(x)$; esto es

$$y_1(x) = \sqrt{r} e^{\frac{1}{2} i\theta} \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

$$y_2(x) = \sqrt{r} e^{\frac{1}{2} i\theta} \quad 2\pi \leq \theta < 4\pi$$

Construimos entonces el nuevo dominio para y :

Se toman dos copias de $\hat{\mathbb{C}}$ cortadas a lo largo del eje real positivo; llamemos a cada una de ellas hojas I y II, que corresponden a $\arg(x) \in [0, 2\pi[$ y $\arg(x) \in [2\pi, 4\pi]$ respectivamente.

El corte en cada hoja tiene dos bordes: +, el superior, -, el inferior; se identifican de a pares, + de I con - de II y - de I con + de II; la superficie resultante, S , es el dominio de y ; allí esta función es claramente univaluada:

y es claro que S es (por lo menos topológicamente) de nuevo $\hat{\mathbb{C}}$. Si complicamos un poco la función,

e.g.

$$y^2 = x(x-1)(x+1)$$

también para cada valor de x se tienen genéricamente dos valores de y : y_1 e y_2 , donde $y_1 = -y_2$, y se pasa de uno a otro continuando $y(x)$ sobre cualquier curva que encierre a una de las raíces $x=0$, $x=1$, $x=-1$.

Evitamos esto último, haciendo un corte de -1 a 0 y otro de 1 a ∞ ; tomamos nuevamente dos copias de $\hat{\mathbb{C}}$ con estos cortes y repetimos el proceso de identificación anterior:

esta vez, obtenemos un toro $= S$.

Este par de ejemplos refleja una situación mucho más general, que trataremos de bosquejar a continuación.

Hay esencialmente cinco maneras de describir estos objetos:

- 1.- Vía Geometría Algebraica : Curvas algebraicas.
- 2.- Vía Análisis : Superficies de Riemann Compactas.
- 3.- Vía Geometría y Topología : Variedades de Dimensión real dos, orientables, compactas, con métrica Riemanniana completa de curvatura constante.
- 4.- Vía Algebra y Análisis : Cuerpos de funciones en una variable.
- 5.- Vía Algebra : Subgrupos discretos y finitamente generados de $SL(2, \mathbb{C})$.

Desde el punto de vista topológico, hay un número natural que

caracteriza completamente las superficies orientables compactas; este es el género, g , de la superficie S y representa el número de asas que agregados a la esfera produce S .

Si $g = 0$, Entonces $S \cong \hat{\mathbb{C}}$

Si $g = 1$, Entonces $S \cong \hat{\mathbb{C}} \cup \{1 \text{ asa}\}$

$\cong$

Si $g = 2$, Entonces $S \cong \hat{\mathbb{C}} \cup \{2 \text{ asas}\}$

$\cong$

Bosquejo de 1) $\rightarrow$ 5) en el caso más simple no trivial $g = 1$:

0) Construcción de superficies de género uno:

Dado $\tau \in \mathbb{C}$, con $\text{Im}(\tau) > 0$, definimos una relación de equivalencia en $\mathbb{C}$ por:

$$z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_1 \sim z_2 \Leftrightarrow \exists n, m \in \mathbb{Z} \quad z_1 = z_2 + n + m\tau$$

Se puede ver entonces que $\mathbb{C} / \sim$ es un toro [] y que el converso también es válido [].

1) Curvas del tipo $y^2 = x(x-1)(x-a)$, $a \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$.

2) y 3) $g = 1$.

4) $\mathbb{C}(P(z), P'(z))$, donde $P(z)$ es la función de Weierstrass.

5) $\mathbb{C}/G$, $G \leq SL(2, \mathbb{C})$, $G \cong \mathbb{Z} + \mathbb{Z}$.

La Geometría analítica nació y se desarrolló sobre los números reales, con las limitaciones propias de éstos; en particular, no tenemos propiedades de clausura, ni en el sentido geométrico ni en el nivel algebraico.

Cada uno de ellos nos lleva a excepciones, que interesa eliminar; para esto extendemos el espacio real a uno que sea cerrado geométricamente y algebraicamente y luego hacemos geometría analítica allí.

Concretamente:

$\mathbb{R}$ no es algebraicamente cerrado, por ejemplo el polinomio con coeficientes reales $x^2 - a$ tiene una raíz en $\mathbb{R}$ (i.e. la parábola en $\mathbb{R}^2$ $y = x^2 - a$ intersecta el eje $X : \mathbb{R}_x$), salvo cuando a es negativo.

Extendemos $\mathbb{R}$ algebraicamente a $\mathbb{C}$ (su clausura algebraica) y desaparece la excepción. Ahora bien, todo polinomio en $\mathbb{C}$ tiene una raíz (i.e. el gráfico de $y = p(x)$ en $\mathbb{C}^2 = \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ intersecta al eje $x = \mathbb{C}_x$), excepto cuando $p(x)$ es una constante no cero. (Teo. Fundamental del Álgebra); esta excepción se debe a que las dos copias paralelas de $\mathbb{C}$ no se intersectan. Removeremos esta excepción:

Extendemos $\mathbb{C}^2$ geométricamente a $\mathbb{P}_2(\mathbb{C})$: agregando un "punto en ∞ " a cada recta compleja $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}^2$. Esto es:

Sea $ax + by = 0$, $a, b \in \mathbb{C}$ cualquier recta compleja por el origen $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}^2$; le agregamos un punto "ideal" $P_\infty(\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{P_\infty\})$; enseguida agregamos este mismo punto P_∞ a todas las rectas complejas $ax + by = c$, $c \in \mathbb{C}$ (i.e. a todas las rectas paralelas a $ax + by = 0$). Como P_∞ es el único punto común a estas rectas, él es el punto donde dos cualesquiera

de esta familia de "paralelas" se intersectan.

Agregamos un punto de éstos a cada recta y todas sus paralelas en $\mathbb{C}^2$. Así extendemos $\mathbb{C}^2$ y formamos el espacio complejo proyectivo $\mathbb{P}_2(\mathbb{C})$, de tal manera que cualesquiera dos rectas diferentes completadas se intersectan en exactamente un punto.

Todos los puntos agregados en ∞ forman una recta compleja, llamada la "recta en ∞ ", esta recta intersecta a cualquier otra recta en un punto.

Se puede dar una topología a $\mathbb{P}_2(\mathbb{C})$, de manera que las rectas completadas sean esferas topológicas.

Queremos entonces dibujar curvas en $\mathbb{P}_2(\mathbb{C})$; dado un polinomio p no constante en $\mathbb{C}[x, y]$, él define una curva C en $\mathbb{C}^2$ por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 : p(x, y) = 0\}$$

y la clausura topológica de C en $\mathbb{P}_2(\mathbb{C})$ es la curva en $\mathbb{P}_2(\mathbb{C})$ definida por ρ .

Veamos un ejemplo: Sea $p(x, y) = y - x^2$; entonces

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 / y = x^2\}$$

es homeomorfa a $\mathbb{C}$, como se ve del gráfico idealizado:

es decir, el gráfico de $p = 0$ es una superficie de dos dimensiones reales en $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$.

Para analizar esta superficie, adoptaremos el método canónico; se fija una de las coordenadas, pudiéndose pensar como la coordenada temporal t , y se obtiene así cortes de C que corresponden a curvas C_t que podemos dibujar en $\mathbb{R}^3$; luego, estas curvas se "juntan" para obtener C .

Más explícitamente: escribamos

$$x = x_1 + i x_2$$

$$\text{con } x_j, y_j \in \mathbb{R}$$

$$y = y_1 + i y_2$$

Entonces $(x, y) \in C$ si y sólo si

$$(*) \quad \begin{cases} y_1 = x_1^2 - x_2^2 \\ y_2 = 2x_1x_2 \end{cases} \quad \text{en } \mathbb{R}^4$$

Pensamos en $x_2 = t$, y analizamos diversos casos:

i) $x_2 = 0$. Entonces $(*)$ se transforma en

$$C_0 : \begin{cases} y_2 = 0 \\ y_1 = x_1^2 \end{cases} \quad \text{una parábola en el plano } x_1y_1.$$

ii) $x_2 = t \neq 0$. Entonces (*) se transforma en

$$C_t : \begin{cases} y_2 = 2tx_1 \\ y_1 = x_1^2 - t^2 \end{cases} \quad \text{una parábola en el plano } y_2 = 2tx_1$$

Ahora, como se tiene que si $y = x^2$ entonces $\lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{|y|}{|x|} = \infty$, se ve que en cada parábola C_t nos aproximamos al mismo punto P_∞ agregado a la recta $x = 0$ cuando x ó y tienden a ∞ ; es decir, la clausura de cada C_t es una curva cerrada, $\bar{C}_t = C_t \cup \{P_\infty\}$, y dos tales curvas cerradas se tocan en un solo punto, P_∞ .

Obtenemos así una esfera topológica en $\mathbb{P}_2(\mathbb{C})$:

Muy diferente de la simple parábola que se obtiene al dibujar:
 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$.

Un poco más complejo es el ejemplo siguiente:

$$\text{Sea } p_r(x, y) = x^2 + y^2 - r, \quad r \in \mathbb{R}$$

$$C^r = \{(x, y) \in \mathbb{A}^2 : p_r(x, y) = 0\}$$

Estudiamos primero el caso $r > 0$, digamos $r = 1$ para simplificar:

Entonces $x^2 + y^2 = 1$ es equivalente a

$$(**) \quad \begin{cases} x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 - y_2^2 = 1 \\ x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0 \end{cases}$$

i) $x_2 = 0$: (**) se transforma en:

$$\begin{cases} y_2 = 0 \\ x_1^2 + y_1^2 = 0 \end{cases} \quad \text{ó} \quad \begin{cases} y_1 = 0 \\ x_1^2 - y_2^2 = 1 \end{cases}$$

En particular, el caso $x_2 = y_1 = 0$ se grafica:

y se ve que ambas ramas de la hipérbola en conjunto con los dos puntos al infinito Q_∞^1 y Q_∞^2 , forman una circunsferencia topológica; obteniéndose así que la clausura de C_0^1 consiste de dos circunsferencias topológicas que se tocan en dos puntos:

- ii) $x_2 = t \neq 0$. En este caso, se puede ver de manera análoga, que al variar t en $\mathbb{R} - \{0\}$, se obtiene para la clausura topológica de C_t^1 , las curvas restantes hasta llenar nuevamente una esfera topológica para la clausura de C^1 en $\mathbb{P}_2(\mathbb{C})$.

De nuevo, el gráfico en $\mathbb{R}^2$ es apenas una circunsferencia.

Si ahora consideramos

$$C^0 = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 / x^2 + y^2 = 0\}$$

vemos que es la unión de dos rectas complejas, dadas por $x + iy = 0$, y $x - iy = 0$, que se tocan en un solo punto $(0, 0)$; pasando a la clausura topológica, obtenemos dos esferas que se tocan en un solo punto; esta superficie corresponde a haber "estrangulado" el ecuador de la clausura de C^1 .

En $\mathbb{R}^2$, el gráfico de C^0 es sólo un punto. Más aún, para C^{-1} , obtenemos el conjunto vacío en $\mathbb{R}^2$, y nuevamente una esfera topológica en $\mathbb{P}_2(\mathbb{C})$.

Esta situación refleja el hecho de que para $r \neq 0$ tenemos que p_r es un polinomio irreducible, en cambio p_0 es factorizable.

Para polinomios más generales, obtenemos superficies de género superior; nos limitaremos a bosquejar algunos gráficos;

$$\text{Sea } p_\varepsilon(x, y) = y^2 - x(x - \varepsilon)(x + 1).$$

Cuando $\varepsilon = 1$, obtenemos:

en $\mathbb{R}^2$

en $\mathbb{R}^3$ ($x_2 = 0$)

es decir, tres curvas cerradas, cada una tocando a las otras dos en dos puntos.

Suponiendo estas curvas con las correspondientes a $x_2 = t \neq 0$, obtenemos un toro de género uno:

Cuando $\varepsilon = 0$, obtenemos $y^2 - x^2 (x + 1)$:

en $\mathbb{R}^2$

en $\mathbb{R}^3$ ($x_2 = 0$)

y se tiene la situación límite del toro de género uno, alcanzada por es trangulación de un lazo en el toro, dando origen a una superficie con nodos.

Si tomamos polinomios del tipo $y^2 - x(x^2 - 1^2)(x^2 - 2^2)(x^2 - g^2)$ se obtienen superficies compactas de género g ; y permitiendo raíces repetidas, se obtienen superficies compactas con nodos, que aparecen así naturalmente.

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965