REVISTA PROYECCIONES: 179-200.
JORNADAS MATEMATICAS, AGOSTO 1983.

ESPACIOS UNIFORMES

Dr. SAMUEL NAVARRO HERNANDEZ *

NOCIONES BASICAS SOBRE FILTROS.

Sea X un conjunto no vacío, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es un filtro sobre X si

- 1) Dados A, B en $\mathcal{F}$ se tiene $A \cap B \in \mathcal{F}$
- 2) Si $A \in \mathcal{F}$ y $A \subseteq B$ entonces $B \in \mathcal{F}$
- 3) $\emptyset \notin \mathcal{F}$

Un conjunto $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$, $\mathcal{B} \neq \emptyset$ es una base de filtro sobre X si

- 1) Dados A, B en $\mathcal{B}$ se tiene $A \cap B \in \mathcal{B}$
- 2) $\emptyset \notin \mathcal{B}$

Un conjunto $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$, $\mathcal{S} \neq \emptyset$ es una subbase de filtro sobre X si

* Profesor Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación,
Facultad de Ciencia. Universidad de Santiago de Chile.

- 1) Toda familia finita en S tiene intersección no vacía.

CONSTRUCCION DE FILTROS Y BASES DE FILTRO.

- A) Si B es base de filtro entonces

$$F = \{A \subseteq X / A \supseteq B \text{ para algún } B \text{ en } B\}$$

es un filtro que se llama filtro generado por B .

Si S es subbase de filtro entonces

$$B = \{B \subseteq X / B = \bigcap_{i=1}^n S_i, S_i \in S\}$$

es una base de filtro.

Obs.: Un filtro puede tener más de una base. En un conjunto X puede haber tantos filtros como permita la cardinalidad de X .

Notación. $\Phi(X) = \{F / F \text{ es un filtro sobre } X\}$ $(\Phi(X), \subseteq)$ es ordenado.

Ejemplos:

- 1) Dado $x \in X$, $\{x\}$ es una base de filtro.

Se usa la notación $\dot{x}$ para el filtro generado por $\{x\}$.

- 2) Si X es infinito

$B = \{A / A^c \text{ finito}\}$ es base de filtro.

- 3) Si X es espacio topológico y $x \in X$

$V(x) = \{\text{las vecindades abiertas de } x\}$ es una base de filtro.

- 4) Si $\{X_n\}$ es una sucesión en X $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ donde
 $B_n = \{x_m / m \geq n\}$, es una base de filtro.
- 5) $F = \{X\}$ es un filtro.
- 6) Si $X = \mathbb{N}$
 $F = \{A_n / A_n = \{m / m \geq n\}\}$
 se llama filtro de Frèchet.
- 7) Si X es preordenado filtrante según σ y $a \in X$ anotamos el conjunto
 $S(a) = \{x \in X / a \sigma x\}$
 que llamamos sección de a .
 $B = \{S(a) / a \in X\}$ es una base de filtro, el filtro generado se
 llama filtro de las secciones de X .

Def.:

Un ultrafiltro es un elemento maximal de $(\Phi(X), \subseteq)$

Obs.:

Para cada filtro hay un ultrafiltro que lo contiene (Zorn).

Una forma de caracterizar los ultrafiltros es:

- 1) F es un ultrafiltro ssi $A \cup B \in F$
 $\implies A \in F \text{ ó } B \in F$
- 2) F es un ultrafiltro ssi
 $A \cap F \neq \emptyset \forall F \in F$ implica $A \in F$

FILTROS INDUCIDOS.

Sea X un conjunto, $S \subseteq X$, F un filtro sobre X , definimos el conjunto

$$F_S = \{A \cap S / A \in F\}$$

que llamamos traza de F sobre S .

Obs.:

F_S es un filtro en S ssi

F está frecuentemente en S (i.e. $A \cap S \neq \emptyset \forall A \in F$)

Producto:

Si X, X' son dos conjuntos

B, B' dos bases de filtro en X y X' respectivamente.

$$\mathcal{B} = \{B_1 \times B_2 / B_1 \in B, B_2 \in B'\}$$

es una base de filtro en $X \times X'$.

(El caso infinito también vale)

$$\mathcal{B} = \{\mathbb{B}_i / B_i \in B, B_i \neq X \text{ sólo en un número finito de índices}\}$$

es una base de filtro en $\mathbb{N}X_i$

Dados X, X' conjuntos

$f : X \longrightarrow X'$ una función.

y F un filtro en X siempre se tiene que

$f(F)$ es base de filtro en X' .

ESPACIOS UNIFORMES.

Sea X conjunto no vacío. Para $W, V \subset X \times X$ definimos:

$$W^{-1} = \{(y, x) \in X \times X / (x, y) \in W\}$$

$$V \circ W = \{(x, z) \in X \times X / \exists y \in X \ni (x, y) \in W \wedge (y, z) \in V\}$$

La diagonal de $X \times X$ es:

$$\Delta = \{(x, x) / x \in X\}$$

Sea $\mathcal{U}$ un filtro sobre $X \times X$ satisfaciendo los axiomas:

- 1) $\forall W \in \mathcal{U}, \Delta \subset W$
- 2) $W \in \mathcal{U} \implies W^{-1} \in \mathcal{U}$
- 3) $\forall W \in \mathcal{U}, \exists V \in \mathcal{U} \ni V \circ V \subset W$

Decimos que el filtro $\mathcal{U}$ define una uniformidad o una estructura uniforme sobre X y cada $W \in \mathcal{U}$ es llamada una vecindad de la uniformidad. (conector).

Def.:

El par $(X, \mathcal{U})$ se llama Espacio Uniforme.

Def.:

Una estructura uniforme $\mathcal{U}$ sobre X es Hausdorff si

$$\bigcap \{W / W \in \mathcal{U}\} = \Delta$$

Ejemplo:

$$1) \mathcal{U} = \{A \times B \subset X \times X / A \times B \supset \Delta\}$$

$$2) U = \{X \times X\}$$

$$3) \text{ Sea } X = \mathbb{R}^+ \text{ y sea } H = \{V_\alpha \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ / \alpha \in \mathbb{R}^+\} \text{ donde}$$

$$V_\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ / |x - y| < \alpha\}$$

Entonces H es una base de filtro sobre $X \times X$ y el filtro U generado por H define una uniformidad sobre $X = \mathbb{R}^+$.

Dados X conjunto, U estructura uniforme en $X \times X$ se define V como la familia de subconjuntos $G \subset X$ tal que:
si $X \in G$ entonces $\exists W \in U \ni \{y \in X / (x, y) \in W\} \subset G$

Prop.:

Sean $G_i \in V, i = 1, \dots, n$ entonces

$$\bigcap_{i=1}^n G_i \in V$$

$$\text{Sea: } X \in \bigcap_{i=1}^n G_i \implies X \in G_i \quad \forall i = 1, \dots, n \implies \exists W_i \in U$$

$$\text{tal que: } \{y \in X / (x, y) \in W_i\} \subset G_i \quad \forall i = 1, \dots, n \implies$$

$$\bigcap_{i=1}^n \{y \in X / (x, y) \in W_i\} \subset \bigcap_{i=1}^n G_i$$

$$\begin{aligned} \text{Como } U \text{ es filtro, } \bigcap_{i=1}^n W_i = \tilde{W} \in U \implies \{y \in X / (x, y) \in \tilde{W}\} \\ \subset \bigcap_{i=1}^n \{y \in X / (x, y) \in W_i\} \subset \bigcap_{i=1}^n G_i \implies \bigcap_{i=1}^n G_i \in V \end{aligned}$$

Prop.:

$$\begin{aligned} \text{Dado } G_i \in V, i \in I, \text{ conjunto de índices arbitrario} \\ \implies \bigcup_{i \in I} G_i \in V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sea } X \in \bigcup_{i \in I} G_i \implies \exists j \in I \text{ tal que: } X \in G_j \implies \exists \tilde{W} \in U \ni \\ \{y \in X / (x, y) \in \tilde{W}\} \subset G_j \implies \{y \in X / (x, y) \in \tilde{W}\} \subset \bigcup_{i \in I} G_i \implies \\ \bigcup_{i \in I} G_i \in V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Además } X \in V \text{ puesto que } \forall W \in U \forall x \in X \{y \in X / (x, y) \in W\} \\ \subset X \implies X \in V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{También } \phi \in V, \text{ pues sino: " } \exists x \in \phi \text{ tal que } \forall W \in \beta \\ \{y \in X / (x, y) \in W\} \not\subset \phi \text{ " (} \implies \Leftarrow \text{)} \end{aligned}$$

Obs.:

V define una topología T_V sobre $X \ni \forall x \in X$ la familia $W(x) = \{y \in X / (x, y) \in W\}$ donde W recorre U es una base de vecindades de X .

Def.:

- Un espacio topológico X es uniformizable si su topología puede ser derivada de una uniformidad sobre X .
- La topología derivada de la uniformidad es una topología de Hausdorff si la uniformidad es Hausdorff.

Prop.:

Un espacio topológico de Hausdorff es uniformizable ssi es completamente regular (X es completamente regular si $F \subset X$ cerrado y $p \in X \setminus F$, $\exists f: X \rightarrow [0, 1]$ continua t.q. $f(p) = 0$ y $f(F) = 1$)

Definición.

Sean (X, U_1) (Y, U_2) espacios uniformes. Una aplicación

$f: X \longrightarrow Y$ es uniformemente continua si $\forall V$ en $U_1 \exists U$ conector en U_1 tal que $(x, y) \in U \implies (f(x), f(y)) \in V$

Prop.:

Cada aplicación uniformemente continua es continua.

Dem.: Trivial.

Obs.:

- 1) Los espacios uniformes X, Y son isomorfos si $\exists f: X \longrightarrow Y$ biyectiva tal que f y f^{-1} son uniformemente continuas.
 f es llamado "isomorfismo uniforme".
- 2) Si U_1 y U_2 son dos filtros sobre $X \times X$ que definen uniformidades sobre X y si $U_1 \subset U_2$ decimos que la uniformidad definida por U_1 menos fina que la definida por U_2 .
- 3) Si X es un conjunto $\{X_\alpha / \alpha \in A\}$ familia de espacios uniformes y $f_\alpha: X \longrightarrow X_\alpha$, entonces, existe una uniformidad menos fina sobre X para la cual $f_\alpha, \alpha \in A$ son uniformemente continuas.

Como caso particular la uniformidad producto sobre $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$

Similarmente si X es un espacio uniforme y $S \subset X$ la uniformidad inducida es la uniformidad sobre S menos fina para la cual la inyección canónica $i: S \longrightarrow X$ es uniformemente continua.

Def.:

(X, U) esp. uniforme, F un filtro sobre X es convergente a $x \in X$, si F es más fino que $\{W(x) / W \in U\}$

Def.:

Sea X espacio uniforme. Un filtro F sobre X es un filtro de Cauchy si para cada vecindad $V \in U \exists F \in F$ t.q. $F \times F \subset V$.

Si cada filtro de Cauchy converge (a un elemento de X) entonces X es llamado completo.

Obs.:

- 1) Si $f: (X, U_1) \longrightarrow (Y, U_2)$ es uniformemente continua y F filtro de Cauchy en $X \implies f(F)$ filtro de Cauchy en Y .
- 2) Para cada espacio uniforme X podemos construir un espacio uniforme completo $\hat{X}$ tal que X es uniformemente isomorfo a un subespacio denso de $\hat{X}$ y tal que $\hat{X}$ es Hausdorff si X lo es. Si X es Hausdorff, entonces $\hat{X}$ es determinado por estas propiedades por el isomorfismo y es llamado la completación de X .

Una base de vecindades de uniformidad de $\hat{X}$ puede ser obtenida tomando las clausuras (en la topología producto $\hat{X} \times \hat{X}$) de la base de vecindades de uniformidad de X .

- 3) Si cada sucesión de Cauchy en X converge, entonces X es llamado semicompleto o secuencialmente completo.
- 4) Si X es un espacio uniforme completo y A un subespacio cerrado en X entonces el espacio uniforme A es completo.
- 5) Si X es un espacio uniforme completo y A un subespacio completo en X entonces A es cerrado en X .
- 6) Un producto de espacios uniformes es completo ssi cada espacio factor es completo.
- 7) Si X es un espacio uniforme, Y un espacio completo Hausdorff, $X_0 \subset X$ y $f: X_0 \longrightarrow Y$ uniformemente continua, entonces f tiene una única extensión uniformemente continua: $\bar{f}: \overline{X_0} \longrightarrow Y$.

EXTENSION POR CONTINUIDAD.

Teorema: Sea X espacio topológico $A \subset X$ denso, $f: A \rightarrow Y$, Y regular (es decir $F \subset Y$ cerrado, $p \in Y \setminus F$, $\exists V, W$ abiertos disjuntos $\ni F \subset V$ y $p \in W$) entonces f se extiende continuamente a $\bar{f}: X \rightarrow Y$ ssi $\forall x \in X$,

$$\lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y \in A}} f(y) = Z \in Y$$

Dem.:

$$\bar{f} \text{ continua sobre } X \implies \forall x \in X$$

$$\bar{f}(x) = \lim_{y \rightarrow x} \bar{f}(y) = \lim_{y \rightarrow x} f(y)$$

$$\begin{array}{cc} y \rightarrow x & y \rightarrow x \\ y \in A & y \in A \end{array}$$

Recíprocamente: sea

$$f(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y) \quad \forall x \in X$$

$$\begin{array}{c} y \rightarrow x \\ x \in A \end{array}$$

$\bar{f}$ está definida pues Y es Hausdorff Pd. $\bar{f}$ es continua $\forall x \in X$

Sea V' vecindad cerrada de $\bar{f}(x)$ en $Y \implies \exists V$ vecindad abierta de $x \in X \ni \ni f(V \cap A) \subset V' \implies \bar{f}(Z) = \lim_{y \rightarrow Z} f(y) \quad \forall Z \in V$

$$y \rightarrow Z$$

$$y \in A$$

$\implies \bar{f}(Z) \in \overline{f(V \cap A)} \subset V'$ puesto que V' es cerrado y el resultado sigue del hecho de que vecindades cerradas de $f(x)$ forman un sistema fundamental de vecindades de $f(X)$ en Y .

Prop.:

Sea X espacio topológico $A \subset X$ denso y $f: A \rightarrow X'$ donde X' es esp. unif. completo T_2 , entonces f puede ser extendida a X por continuidad ssi $\forall x \in X$, la imagen bajo f de la traza sobre A del filtro de vecindades de $x \in X$, es una base de filtro de Cauchy en X' .

Dem.:

Sigue del teorema anterior porque X' es regular y porque sobre X' los filtros de Cauchy son convergentes.

LA COMPLETACION DE UN ESPACIO UNIFORME.

Teorema:

Sea X espacio uniforme. Entonces existe un espacio uniforme T_2 completo $\hat{X}$ y una aplicación uniformemente continua $i: X \rightarrow \hat{X}$ t. q
(P): Dada cualquier aplicación uniformemente continua $f: X \rightarrow Y$, Y espacio uniforme T_2 , $\exists!$ aplicación uniformemente continua.

$$g: \hat{X} \rightarrow Y \text{ t.q. } f = g \circ i$$

(e.d. i es una aplicación universal).

Si (i_1, X_1) es otro par donde X_1 es un e.u.c. T_2 e $i_1: X \rightarrow X_1$ u.c. t.q. verifica (P) entonces $\exists! \gamma: \hat{X} \rightarrow X_1$ isomorfismo t.q. $i_1 = \gamma \circ i$

Definición:

El e.u.c. T_2 , $\hat{X}$ del Teorema es llamado la completación de Hausdorff de X , y la aplicación $i : X \longrightarrow \hat{X}$ es llamada la aplicación canónica de X en su completación de Hausdorff.

Propiedades:

- 1) Si X es un e.u. T_2 entonces $i : X \longrightarrow \hat{X}$ es un isomorfismo de sobre un subespacio denso de $\hat{X}$ (esto caracteriza la completación de un espacio T_2).
- 2) Si X no es T_2 , entonces sólo podemos asegurar que $i(X)$ es un subespacio denso de $\hat{X}$.

UNIFORMIDAD Y ESPACIOS VECTORIALES TOPOLOGICOS.

Definición.

Una uniformidad sobre un espacio vectorial L es llamada invariante bajo traslación si tiene una base $\mathcal{N}$ tal que $(x, y) \in N$ es equivalente con $(x + z, y + z) \in N \quad \forall z \in L \quad y \quad N \in \mathcal{N}$

$$(x, y) \in N \iff (x + z, y + z) \in N$$

Proposición.

La topología de cualquier espacio vectorial topológico puede ser derivada de una única uniformidad $\mathcal{N}$ invariante bajo traslación. Si $\mathcal{B}$ es cualquier base de vecindades de 0 , la familia $\mathcal{N}_{\mathcal{B}} = \{(x, y) / x - y \in V\}, V \in \mathcal{B}$ es una base para $\mathcal{N}$.

Dem.:

Sea (L, C) e.v.t. con $\mathcal{B}$ base de vecindades de 0 .

P.d. $\hat{\mathcal{N}} = \{N_V / V \in \mathcal{B}\}$ forman una base de filtro sobre $L \times L$.

- i) $\hat{\mathcal{N}} \neq \emptyset$ pues $\forall V \in \mathcal{B}, 0 \in V \implies (0, 0) \in N_V \wedge N_V \neq \emptyset \quad \forall N_V$
- ii) $N_V, N_W \in \hat{\mathcal{N}} \implies V \subset W \text{ ó } W \subset V$ sin pérdida de generalidad

$$V \subset W \implies N_V \subset N_V \cap N_W$$

Luego $\hat{\mathcal{N}}$ es una base de filtro sobre $L \times L$ que es una base para la uniformidad $\mathcal{N}$ invariante bajo traslación produciendo la topología C de L .

Si N_1 es otra uniformidad con estas propiedades existe una base M de N_1 consistente de conjuntos invariantes bajo traslación y t.q. los conjuntos

$U_m = \{x - y / (x, y) \in m\}$, $m \in M$ forman una base de vecindades de 0 para C , puesto que:

$$(U_m \subset V \iff m \subset N_V) \implies N_1 = N$$

Obs.:

- 1) $A \subset L$ es completo ssi cada filtro de Cauchy en A converge a un elemento de A (A con la uniformidad inducida).
- 2) Un e.v.t. L es un e.v. Hausdorff ssi L es un esp. unif. T_2 .

Luego L es T_2 ssi $\bigcap \{U, U \in \mathcal{U}\} = \{0\}$, donde U es cualquier base de vecindades de 0 en L .

- 3) Si L es esp. vect. top, por un subespacio de L entendemos un subespacio M (es decir $M \neq \emptyset$, $M + M \subset M$, $K M \subset M$) provisto de la topología inducida por L .

M e.v.t es T_2 si L lo es.

- 4) L esp. vect. top $T_2 \implies L$ es completamente regular.

Teorema. (Completación de L).

Sea L esp. vect. top T_2 , entonces existe un esp. vect. top. c. T_2 $\hat{L}$ sobre K t.q. $L \subset \hat{L}$ es denso, $\hat{L}$ es único salvo isomorfismo. Además para cualquier base B de vecindades de 0 en L , la familia $\hat{B} = \{\bar{V}, V \in B\}$ de clausuras en $\hat{L}$ es una base de vecindades de 0 en $\hat{L}$.

Dem.:

Asumamos conocido la existencia de un e.u.c. $T_2 \hat{L}$ el cual contiene a L como subespacio denso, el cual es único salvo isomorfismo uniforme. Por proposición anterior:

$$\left. \begin{array}{l} + : L \times L \longrightarrow \hat{L} \\ \quad (x, y) \longrightarrow x + y \\ \\ \cdot : K \times L \longrightarrow \hat{L} \\ \quad (\lambda, x) \longrightarrow \lambda x \end{array} \right\} \text{son uniformemente continuas}$$

En efecto:

$$\begin{array}{ccccc} + : & (L, T) \times (L, T) & \xrightarrow{c} & (L, T) & \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ & (L, U_T) \times (L, U_T) & \longrightarrow & (L, U_T) & \xrightarrow{u.c} (\hat{L}, \hat{U}) \\ & & & + & \end{array}$$

(A horizontal line with an arrow at the end connects the bottom of the first column to the bottom of the last column.)

P.d. Dado $\hat{U} \in \hat{\mathcal{U}}$ $U \in U_T \times U_T$ t.q $U + U \subset \hat{U}$

sea B base de vecindades de 0 en T , entonces

$\{N_v / v \in B\}$ es base de U_T

Por continuidad de $+$, dado $T \in T \exists S \times S \in T \text{ e } T$ t.q $S + S \subset T$ (donde S y T son vecindades de 0).

Pero asociado a S tenemos N_S y a T , N_T . Ahora, dado $\hat{U} \in \hat{\mathcal{U}} \exists U \in U_T$ tal que $U \subset \hat{U}$ pero $\{N_v\}$ es base de U_T
 $\implies \exists T \in T$ t.q $N_T \subset U$.

Luego, si probamos que:

$N_S + N_S \subset N_T \subset U \subset \hat{U}$ tendríamos que dado $\hat{U} \in \hat{\mathcal{U}}$,

$\exists N_S \times N_S \in U_T \times U_T$ t.q $N_S + N_S \subset \tilde{U}$, lo que probaría la continuidad uniforme.

En efecto,

$$\begin{aligned} (a, b) \in N_S &\implies a - b \in S \\ (c, d) \in N_S &\implies c - d \in S \end{aligned} \quad \} \implies$$

$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \in N_T$, puesto que

$$a + c - (b + d) = \underbrace{(a - b)}_{\in S} + \underbrace{(c - d)}_{\in S} \in T$$

Luego $+_Y$ tiene únicas extensiones continuas

$$\begin{aligned} + : \tilde{L} \times \tilde{L} &\longrightarrow \tilde{L} \\ . : K \times \tilde{L} &\longrightarrow \tilde{L}^Y \end{aligned}$$

que transforma a $\tilde{L}$ en un e. vect. sobre K .

Puesto que $\{N_v / v \in B\}$ es base de la uniformidad U de L , las clausuras $\bar{N}_v$ es base de la uniformidad $\tilde{U}$ de $\tilde{L}$ y además $\bar{N}_v = \bar{N}_v \forall v \in B$ (Se prueba usando la continuidad de $\tilde{L} \times \tilde{L} \longrightarrow \tilde{L} : (\tilde{x}, \tilde{y}) \longrightarrow (\tilde{x} - \tilde{y})$).

Luego $\tilde{B} = \{\bar{V} / v \in B\}$ es base de vecindades de 0 en $\tilde{L}$.

P.d la topología $\tilde{T}$ definida por $\tilde{U}$ hace a $\tilde{L}$ un esp. vect. top.

Es claro que $\tilde{T}$ es invariante bajo traslaciones pues estamos tomando los $\bar{N}_v = N_v^-$

Además como B satisface:

$$a) \forall v \in B, \exists U \in B \text{ t.q } U + U \subset v$$

b) $\forall v \in B$ es equilibrado y absorbente.

c) $\forall \lambda \in K, 0 < |\lambda| < 1$ tal que $v \in B \implies \lambda v \in B$
se deduce que B satisface a) y c) puesto que

$$a) \bar{U} + \bar{U} = \overline{U + U} \subset \bar{V} \quad y$$

$$c) v \in B \implies \lambda v \in B \implies \lambda \bar{v} \in \tilde{B}$$

es decir $\bar{v} \in \tilde{B} \implies \lambda \bar{v} \in \tilde{B}$

P.d. (b) con lo cual probaríamos que $(\tilde{L}, \tilde{T})$ es esp. vect. top.

Sea $v \in B$, $\exists U$ vecindad de cero equilibrada t.q
 $U + U \subset V$. Luego $\overline{U + U}$ en $\tilde{L}$ es vecindad de cero equilibrada y
 $\overline{U + U} \subset \bar{V}$.

P.d. que es absorbente.

Sea $\tilde{x} \in \tilde{L}$, $\exists F$ filtro de Cauchy en L convergente a $\tilde{x}$ y $F \in F$
t.q $F - F \subset V$.

Sea $X_0 \in F$ arbitrario, puesto que U es absorbente
 $\exists \lambda \in K$ t.q $X_0 \in \lambda U$ y como U es absorbente podemos asumir que
 $|\lambda| \geq 1$.

Además $F - X_0 \subset U \implies F \subset X_0 + U$ y $\tilde{x} \in F \subset \lambda \overline{(U + U)}$, es decir
 $\lambda \tilde{x} \in \overline{U + U} \quad \forall \tilde{x} \in \tilde{L}$.

La unicidad sale del hecho de que $(\tilde{L}, \tilde{T})$ como e.v. es único.

APENDICE.

Se puede caracterizar un espacio uniforme usando pseudométricas o cubrimientos.

1) Vía pseudométricas.

Dado X conjunto no vacío

$\rho : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}^+$ es una pseudométrica sobre X si

1. $\rho(x, x) = 0 \quad \forall x \in X$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x) \quad \forall x, y \in X$
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) \quad \forall x, y, z \in X$

Una familia $(\rho_i)_{i \in I}$ de pseudométricas sobre X está asociada a una uniformidad sobre X si la familia

$$S = \{H(i, \varepsilon) / i \in I, \varepsilon > 0\}$$

donde $H(i, \varepsilon) = \{(x, y) / \rho_i(x, y) < \varepsilon\}$ es una subbase de U .

Resultado:

Dada una familia de pseudométricas $(\rho_i)_{i \in I}$ sobre X , existe una uniformidad U sobre X a la cual está asociada esta familia.

Se puede definir espacio uniforme usando sólo el concepto de pseudométrica de la forma siguiente:

Una estructura uniforme sobre X es una familia D de pseudométricas sobre X que verifica.

- 1) Si $\rho_1, \rho_2 \in D$ entonces $\max\{\rho_1, \rho_2\} \in D$

- 2) Si γ es una pseudométrica en X y dado $\varepsilon > 0$, existe $\rho \in D$ y $\delta > 0$ tal que

$$\rho(x, y) \leq \delta \implies \gamma(x, y) \leq \varepsilon$$

entonces

$$\gamma \in D$$

2) Vía cubrimientos.

Sea X un conjunto no vacío, la familia $C = \{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ de subconjuntos de X es un cubrimiento de X si $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = X$.

Dados $C_1 = \{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$, $C_2 = \{B_\beta\}_{\beta \in J}$ dos cubrimientos de X , C_2 refina C_1 (ó C_2 es un refinamiento de C_1) si $\forall B_\beta, \exists A_\alpha$ t.q $B_\beta \subseteq A_\alpha$.

Por ejemplo todo subcubrimiento refina el cubrimiento.

Un cubrimiento B de X es un refinamiento baricéntrico de C si

$$\{St(x, B) / x \in X\} \quad \text{donde}$$

$$St(y, B) = \bigcup \{B_\beta / y \in B_\beta\}$$

es un refinamiento de C .

Definición.

Una familia $G = \{C_\alpha / \alpha \in I\}$ de cubrimientos de X es una familia uniformizante si

- 1) Cada par de cubrimientos C_α, C_β en G tiene un refinamiento común C_δ en G .

- 2) Cada cubrimiento C_α en G posee un refinamiento baricéntrico C_β en G .

Resultado.

Sea $G = \{C_\alpha / \alpha \in I\}$ una familia uniformizante en X , para cada $\alpha \in I$ se define

$$V_\alpha = \bigcup \{U \times U / U \in C_\alpha\}$$

entonces,

$u(G) = \{V_\alpha / \alpha \in I\}$ es una uniformidad en X . $(X, u(G))$ es un esp. uniforme.

Recíprocamente dado U una uniformidad en X , para $V \in U$ se define el cubrimiento de X

$$C(V) = \{\text{vecindades de } x / x \in X\}$$

entonces la familia

$$c(U) = \{C(V) / V \in U\}$$

es una familia uniformizante de X .

BIBLIOGRAFIA.

Bourbaki, N. General Topology. Addison-Wesley. 1966.

Dugundji, J. Topology. Allyn and Bacon. 1966.

Gillman-Jerison. Rings of continuous functions. Springer Verlag.

Kelley, J. Topología General. Eudeba. 1962.

Schaeffer, H. Topological Vector Spaces. Springer Verlag. 1980.